



สรุปลักษณะโรคไข้เลือดออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3261 1437 ต่อ 414


ประจำสัปดาห์ที่ 2 ณ.วันที่ 21 มกราคม 2562

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 ถึง 15 ม.ค.2562 พบผู้ป่วย 715 ราย อัตราป่วย 1.08 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยมากกว่าปี 2561 ณ.ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.60 ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วย สะสมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สงขลา อัตราป่วย 6.05 (86 ราย) ปัตตานี 4.96 (35 ราย) และภูเก็ต 4.77 (19ราย) ต่อแสนประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ลำดับที่ 42 ของประเทศ อยู่ลำดับที่ 7 ของเขตบริการสุขภาพที่ 5

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 21 ม.ค.2562 พบผู้ป่วย 24 ราย อัตราป่วย 4.41 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต


พบผู้ป่วยในเดือน ม.ค.24 ราย สูงกว่า คำนวณฐานแต่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา (รูปที่ 1) แนวโน้ม การระบาดเพิ่มสูงขึ้น

พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในกลุ่มอายุ 5-9 ปี มากที่สุด อัตราป่วย 11.73 ต่อแสน ประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี, กลุ่มอายุ 15-24 ปี, กลุ่มอายุ 25-34 ปี, กลุ่ม อายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี อัตราป่วย เท่ากับ 11.51, 10.54, 6.21, 3.29, และ 2.34 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกปี 62 เปรียบเทียบ ปี 61 และ คำนวณฐาน 57-61 จ.ประจวบคีรีขันธ์

อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ อำเภอปราณบุรี อัตราป่วย 10.33ต่อแสน ประชากร รองลงมาคือ อำเภอกุยบุรี, อำเภอ เมือง, อำเภอหัวหิน, อำเภอทับสะแก, อำเภอ บางสะพานน้อย, อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอ บางสะพาน อัตราป่วยเท่ากับ 6.68, 4.38, 4.35, 4.00, 2.51, 2.05 และ 0.00 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (รูปที่ 2)



รูปที่ 2 อัตราป่วยไข้เลือดออกสะสมรายอำเภอ ปี 2562 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 21 ม.ค.62

จำนวนผู้ป่วย/ตาย โรคไข้เลือดออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ.2562 (ข้อมูล 21 ม.ค. 62)

อำเภอ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
เมือง	4												4
กุยบุรี	3												3
ทับสะแก	2												2
บางสะพาน	0												0
บางสะพานน้อย	1												1
ปราณบุรี	8												8
หัวหิน	5												5
สามร้อยยอด	1												1
รวม	24												24


ที่มา : รายงาน 506 จากสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกจำแนก รายตำบล

จ.ประจวบคีรีขันธ์สัปดาห์ที่ 2

ตำบลที่ต้องเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกเป็นพิเศษ (พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมา) ได้แก่ ต.วังก้ง, ต.ปากน้ำปราณ, ต.สามกระหาย, ต.ห้วยยาง

ปีนี้แนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น ขอความร่วมมือประชาชนทุกหลังคาเรือน และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่ราชการต่างๆช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้าน ในโรงเรียน ในสถานที่ราชการ วัด ทุก 7 วัน ตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค ให้ประชาชนใช้มาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ 1. เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะ ครอบๆ บ้าน ทั้งใบไม้ กิ่งไม้ กิ่งกล้วย จานรองกระถางต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ผึ่ง แผ หรือทำลาย และ 3. เก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ ดำเนินการไปพร้อมๆการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกกัด ทั้งการทายากันยุง กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช้อนไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือวิธีป้องกันยุงโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น



สัญญาณอันตรายของไข้เลือดออก อาการส่วนใหญ่จะมีไข้สูง ไข้ไม่ลด ปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา อาจมีอาการเบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้องร่วมด้วย ต้องสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะ รักษาตามอาการ ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆ เช็ดตัวช่วยลดไข้เป็นระยะๆ ให้กินอาหารอ่อน กินยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น ห้ามกินยาแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน เพราะเสี่ยงเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร และติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด ประคับประคองให้ผู้ป่วยผ่านระยะช็อกหลังไข้ลด ซึ่งเป็นระยะวิกฤตของโรค หากผู้ป่วยฟื้นไข้ดีขึ้นแสดงว่าจะหายเป็นปกติ แต่หากเข้าสู่ภาวะช็อก อาจมีอาการต่อไปนี้ เช่น ชี้นิ่ง อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเต้นเบา เร็ว ปวดท้องกะทันหัน กระหายน้ำ ปัสสาวะน้อยลง มีเลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระเป็นสีดำ ให้ผู้ป่วยรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิต

สำหรับวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยขอให้ระมัดระวังยุงลายที่ชอบอาศัยอยู่ในบ้าน ตามกองเสื่อ ผ้า màn หรือในมุมมืดมออบในบ้าน ขอให้จัดบ้านบริเวณรอบบ้านให้โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในบริเวณที่อับลม หรือมุมมืด มีแสงสว่างน้อย นอนกางมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด หมั่นอาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เพราะกลิ่นเหงื่อโคลจะดึงดูดยุงให้เข้ากัดมากขึ้น และใช้ยาทาป้องกันยุง ผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุงซึ่งปลอดภัย ไม่มีสารเคมี

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 0 3261 1437 ต่อ 414 โทรสาร 0 32611 053 ต่อ 202